





N N N

BIBLIOTHEEK



7 7496 00042338 2

NATIONAAL NATUURHISTORISCH MUSEUM Postbus 9517 2300 RA Leiden Nederland







P L A N T Æ

R A R I O R E S

V I V I S C O L O R I B U S


D E P I C T Æ

Λ

N I C O L A O M E E R B U R G,

*H O R T U L A N O I N A C A D E M I A*

*L U G D U N O B A T A V A.*




*L U G D U N I B A T A V O R U M,*  
A P U D J A C O B U M M E E R B U R G,

M D C C L X X I X.









## P R Æ F A T I O.

**A** longo tempore occupatus in examinandis & delineandis plantis, quæ mihi rariores videbantur, & quarum observandarum egregiam occasionem offerebat Hortus Academicus, tentavi anno septuagesimo quinto primam decadem iconum, propria manu æri incisarum, & naturalibus coloribus depictarum, in lucem emittere; non plane displicuere mea conamina, sic ut, a variis excitatus, quinque decades ab eo tempore ediderim. Finem autem nunc operi impoturus, novas quinque superaddidi tabulas, indicemque tum plantarum, tum papilionum, quas cuique plantæ superaddidi, delineatas ad specimina, quæ in mea Collectione adservantur.

Nomina plantarum omnia desumpta sunt a Celeberrimo Linnæo, °cujus scripta itaque varia etiam citavi, simili modo progressus in descriptione papilionum.



## P R Æ F A T I O.

Pleræque, si non omnes, quas hæcce Collectio continet, plantæ ab aliis depictæ non sunt, faltem, quantum scio, non eo tempore, quo ipse eas in lucem emisi, licet multæ ex iis, ex communicatis annotationibus Clarissimi D. van Royen, in Linnæanis operibus memorantur; &, quum ex sola descriptione easdem non facile cognoscere datur, aliquam faltem utilitatem in delineandis illis attulisse mihi videor, gavius, si peritis in arte non plane displicuerint. Id velim attendant, veritati me magis studuisse, quam tabularum nitori, quem etiam ab homine, qui, a nemine edoctus, sola exercitatione, in arte cælandi parum versatus est, expectare non licet.



**IASMINUM** (*Grandiflorum*) TAB. I.

**IASMINUM** (*Grandiflorum*) foliis oppositis pinnatis; foliolis extimis confluentibus. Linn. Sp. pl. p. 9.

**IASMINUM** (*Grandiflorum*) hispanicum magno flore externe rubente. Linn. Mantiss. 11. 316.

**PAPILIO** (*Helenus*) TAB. I.

**PAPILIO** (*Helenus*) alis caudatis nigris: posticis macula alba: subtus tribus albidis lunulisque septem ferrugineis. Linn. Syst. Nat. 745.

**HEDYOTIS** (*Herbacea*) TAB. II.

**HEDYOTIS** (*Herbacea*) foliis lineari-lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis. Linn. Sp. pl. pag. 147.

**PAPILIO** (*Polydamas*) TAB. II.

**PAPILIO** (*Polydamas*) alis dentatis nigris fascia interrupta flava, posticis subtus maculis linearibus flexuosis rubris. Linn. Syst. Nat. 747.

**SALVIA** (*Paniculata*) TAB. III.

**SALVIA** (*Paniculata*) foliis obovato-cuneiformibus denticulatis nudis, caule frutescente. Linn. Syst. Nat. (2) Mantiss. pag. 25.



**PAPILIO** (*Polydamas*) TAB. III.

**PAPILIO** (*Polydamas*) subtus conspecta; hujus alæ supra fascia lutea è maculis parallelis sagittatis; posticarum margo subtus maculis 7, linearibus, fluxuosis (3) Coccineis.

**COMMELINA** (*Africana*) TAB. IV.

**COMMELINA** (*Africana*) corollis inæqualibus, foliis lanceolatis glabris, caule decumbente. Linn. Sp. pl. p. 60.

**PAPILIO** (*Troilus*) TAB. IV.

**PAPILIO** (*Troilus*) alis caudatis nigris: primoribus punctis marginalibus pallidis; posticis subtus maculis fulvis. Linn. Syst. Nat. 747.

**HYOSCYAMUS** (*Phyfalodes*) TAB. V.

**HYOSCYAMUS** (*Phyfalodes*) foliis ovatis integerrimis, calycibus inflatis subglobosis. Linn. Sp. pl. p. 258.

**PAPILIO** (*Mnemofyne*) TAB. V.

**PAPILIO** (*Mnemofyne*) alis oblongis integerrimis albidinigro-nervosis; primoribus maculis duabus nigris marginalibus. Linn. Syst. Nat. 754.

**DAIS** (*Cotinifolia*) TAB. VI.

**DAIS** (*Cotinifolia*) Linn. Sp. pl. pag. 556.

**PAPILIO** (*Piera*) TAB. VI.

**PAPILIO** (*Piera*) alis oblongis integerrimis albis nigro-nervosis: primoribus maculis duabus nigris marginalibus. Linn. Syst. Nat. 754.

**MARTYNIA** (*Longiflora*) TAB. VII.

**MARTYNIA** (*Longiflora*) caule simplici, foliis orbiculatis repandis. Linn. Syst. Nat. (2) 412.

**PAPILIO** (*Troilus*) TAB. VII.

**PAPILIO** (*Troilus*) subtus conspecta. Linn. Syst. Nat. 746.

**SELAGO** (*Tomentosa*) TAB. VIII.

**SELAGO** (*Tomentosa*) racemis ramosis, foliis ovatis crenatis tomentosis caule prostrato. Linn. Sp. pl. p. 877. n. 7.

**MANULEA** (*Tomentosa*) TAB. VIII.

**MANULEA** (*Tomentosa*) foliis tomentosis, caulibus foliosis, pedunculis multifloris. Linn. Mantiss. 11. pag. 420.

**PAPILIO** (*Pammon*) TAB. VIII.

**PAPILIO** (*Pammon*) subtus conspecta alis caudatis nigris concoloribus omnibus margine maculatis; posticis fascia maculis septem albis. Linn. Syst. Nat. 746.

**CROTON** (*Lobatum*) TAB. IX.

**CROTON** (*Lobatum*) foliis inermi-ferratis: inferioribus quinque lobis; superioribus trilobis. Linn. Sp. pl. p. 1427. Nostra species semper habet folia trifida, caulemque pilosum.



**PAPILIO** (*Demophon*) TAB. IX.

**PAPILIO** (*Demophon*) alis dentatis: supra fascia viridi sub-  
tus griseo marmoratis. Linn. Syst. Nat. 753.

**IMPATIENS** (*Capensis*) TAB. X.

Planta annua, sub dio laete crescens, ad altitudinem quatuor  
pedum, caules lucide rubescunt, geniculatae, stabiles, ra-  
mi alterni teretes, flores lutei intus rubro maculati;

Habitus Impatientis Noli - tangere.

Habitat ad Promontorium Bonae. Sp.

**PAPILIO** (*Seclator*) TAB. X.

**PAPILIO** (*Seclator*) alis integerrimis, primoribus supra  
fuscis fasciaque dilutiore transversali: inferioribus nigris,  
postice albo coeruloque punctatis.

Magnitudo ut in icone. Abdomen & Corpus nigra, alae pri-  
mores supra fuscâ fasciâ integerrima transversali per medium.  
Subtus margo niger ad mediam alam fuscus, cæterum ala  
flava, fasciâ per medium angusta transversali nigro termina-  
ta: alae secundariæ ad abdomen supra fuscæ, cæterum ni-  
græ, versus exteriorem partem, atræ, maculis albis coeru-  
lescentibusque sparsis irregularibus variæ, subtus flavæ, ver-  
sus marginem fuscæ, per medium transversa fascia flava ni-  
gro-circumscripta ornata, quo colore reliqua alae pagina  
tincta est. Versus marginem superiorem viride flavescens  
& ad basim punctulis ternis concoloribus, atque ante fasciam  
ocellis geminis nigris conspicuæ.

**VERONICA** (*Hispanica*) TAB. XI.

**VERONICA** (*Hispanica*) spicis terminalibus, foliis sublinearibus pinnatifido-acute dentatis. Planta perennis. Caules filiformes, quas folia ambiunt oblongiuscula subaequalia, sublinearia, acute pinnatifido-dentata: denticuli divergentes recurvati, ad summitatem quandoque terna, quandoque omnino nulli.

Corollae tubulosae, tubus longitudinem calycis aequans, lacinae coeruleescentes, stamina lutescentia, antherae violaceae.

Habitat in Hispania.

**PAPILIO** (*Demophon*) mas. TAB. XI.

**PAPILIO** (*Demophon*) alis dentatis: supra nigris fascia viridi, subtus griseo marmoratis Linn. Syst. Nat. 753.

**CELASTRUS** (*Lucidus*) TAB. XII.

**CELASTRUS** (*Lucidus*) foliis ovalibus nitidis integerrimis marginatis. Linn. Syst. Nat. 181. Mantiss. 49.

Habitat ad Cap. b. spei.

Frutex erectus: Ramis fuscis, duris; folia alterna, ovata f. obovata, obtusiuscula, venosa, lucida, brevissime petiolata, margine integerrimo reflexo.

Pedunculi axillares, conferti, simplices folio breviores.

Petala concava, stamina corollâ breviora, stylis crassis, stigmata tria divergentia.

**PAPILIO** (*Demoleus*) TAB. XII.

**PAPILIO** (*Demoleus*) alis dentatis fuscis: maculis fasciaque maculosa flavis; posticis ocellis binis. Linn. Syst. Nat. 753.

**AMARYLLIS** (*Undulata*) TAB. XIII.

**AMARYLLIS** (*Undulata*) spathe multiflora. Corol-



lis patulis , petalis undulatis mucronatis basi dilatatis.  
Habitat ad Promontorium Bonae Spei.  
Scapus cum umbella magnitudine umbellae cum pedunculo  
geranii zonalis. Spatha profert circiter 12. flores purpu-  
reos , petalis angusto-lanceolatis , apice valde mucrona-  
tis; basi ipsa ovata, stamina declinata. Linn. Syft. Nat. 237.

**PAPILIO** (*Hecabe*) TAB. XIII.

**PAPILIO** (*Hecabe*) alis integerrimis rotundatis flavis ex-  
timo nigris: singulis subtus punctis pallidis numerosissimis  
Linn. Syft. Nat. 763.

**BROWALLIA** (*Elata*) TAB. XIV.

**BROWALLIA** (*Elata*) pedunculis unifloris multifloris-  
que. Linn. Sp. pl. pag. 880.

Habitat in Peru.

Simillima *B. demissae* , sed caulis duplo major , rigidus ,  
crassitie dimidii digiti , quasi fruticosus; Rami inferiores  
longitudine fere ipsius caulis , quod non in *demissa*.

Folia floralia huic fere glabra. Pedunculi alii uniflori , alii  
triflori , quinqueflori & ultra , corolla faterate cocruleo-  
violacea , nec dilute violacea.

**BROWALLIA** haec est simillima *B. demissae* , distincta  
tamen ab ea caule stricto quasi lignosa Linn. Mantiss. (2)  
421.

**PAPILIO** (*Ulysses*) TAB. XIV.

**PAPILIO** (*Ulysses*) subtus conspecta. Linn. Syft. Nat. 748.

**BROWALLIA** (*Demissa*) TAB. XV.

**BROWALLIA** (*Demissa*) pedunculis unifloris. Linn. Sp.  
pl. pag. 879.

**PAPILIO** (*Demophon*) Mas. TAB. XV.

**PAPILIO** (*Demophon*) subtus Conspecta Linn. Syft. Nat. 753.  
CY-

**CYTISUS** (*Æthiopicus*) TAB. XVI.

**CYTISUS** (*Æthiopicus*) racemis lateralibus strictis, ramis angulatis, foliolis cuniformibus. Linn. Sp. pl. p. 1042.

**PAPILIO** (*Scylla*) TAB. XVI.

**PAPILIO** (*Scylla*) alis subintegerrimis rotundatis fulvis: primoribus supra albis limbo nigro; subtus omnibus nebulosis. Linn. Syst. Nat. 763.

**CROTALARIA** (*Quinquefolia*) TAB. XVII.

**CROTALARIA** (*Quinquefolia*), foliis quinatis Wellia-tandale-cotti. Rheed. mal. 9. p. 51. t. 28. fig. mala.

Foliola angusta lanceolata, obtusa, saepe retusa, subnuda lateralibus brevioribus, calyces campanulati. Flores racemosi alterni glabri. Linn. Sp. pl. pag. 1006.

Obs. In nostra planta folia ima sunt simplicia; paulo altiora sunt terna, adhuc quae altiora sunt quaterna fiunt, donec suprema quinquefida existunt; unde triviale nomen Cl. Linnaeus desumpsit.

**PAPILIO** (*Melpomene*) TAB. XVII.

**PAPILIO** (*Melpomene*) alis oblongis integerrimis nigris: primoribus fascia rubra; posticis basi subtus punctis sanguineis. Linn. Syst. Nat. 758.

**BALTIMORA** (*Recta*) TAB. XVIII.

**CHRYSANTHEMUM** Americanum, caule alato, amplioribus foliis binatis, floribus pallide lutescentibus parvis. Pluk. mant. 46. t. 342. f. 3.

Habitat in Marilandia, ad urbem Baltimore. O. H. U.

Caulis bipedalis, tetragonus, erectus, viridis: lateribus profunde canaliculatis: angulis scabris: rami laterales brevissimi.



Folia opposita, petiolata, ovata, acuminata, ferrata, triner-  
via, patentia, subtomentosa, pilis brevissimis, sericeis;  
antiquioribus scabra.

Paniculae terminales, parvae, flores lutei. Corollulae disci  
tomentosae antheris nigris. Linn. Mantiss. (2). 288.

### PAPILIO (Philoctetes) TAB. XVIII.

PAPILIO (*Philoctetes*) alis subcaudatis fuscis; posticis ocel-  
lis duobus coeruleis pupilla nigra punctisque tribus albus.  
Linn. Syst. Nat. 750.

Alae Primores, subtus fascia lineari alba & linea transversa  
atra baseos: Posticae punctis. 3. albis & maculis 2. violaceis.

### COREOPSIS (Lanceolata) TAB. XIX.

COREOPSIS (*Lanceolata*) foliis lanceolatis, integerri-  
mis ciliatis. Linn. Sp. pl. pag. 1283.

Obs. in nostra planta folia infima semper ternata existunt.

### PAPILIO (Aeneas) TAB. XIX.

PAPILIO (*Aeneas*) alis dentatis atris primoribus supra macula  
viridi; posticis macula palmata sanguinea Linn. Syst. Nat. 747.

### LOBELIA (Minuta) TAB. XX.

LOBELIA (*Minuta*) foliis radicalibus ovatis scapis capillaribus.  
Habitat in cap. b. spei subaquosis ☉.

Planta minuta (uti Cameraria & Bellium minutum) pollicaris.  
Radix filiformis propaginibus repens. Folia radicalia, obo-  
vata, obtusa, tenera, vix crenata, longius petiolata. Sca-  
pus setaceus, bipollicaris, erectus, aphyllus, uniflorus. Ca-  
lyx oblongus, lanceolatus, erectiusculus; Corolla infundi-  
biliformis. Capsula infera oblonga. Affinis Lobeliae Lau-  
rentiae sed tenerior, nec ulla bractea in scapa, a L. Erino  
differt caule nullo. Linn. Mantiss. (2) 192.

### PAPILIO (Ulysses) TAB. XX.

PAPILIO (*Ulysses*) alis dentatis nigris disco coeruleo ra-  
diante; posticis subtus ocellis septem. Linn. Syst. Nat. 748.

## BOERHAVIA (*Scandens*) TAB. XXI.

BOERHAVIA (*Scandens*) caule erecto floribus diandris,  
foliis cordatis acutis.

Caulis 6. pedalis, strictissimus, rectus, lævis.

Folia cordata, glabra.

Umbellæ sexfloræ: involucrum 5. phyllum, deciduum.

Corolla diandra, viridescens Linn. Mantiss. (2) 315.

Valerianella curassavica, femina aspera viscosa.

Pluk. alm. 349. t. 113. f. 7.

Solanum bacciferum americanum, fructu corymboso.

Pluk. alm. 349. t. 226. f. 7.

Perperam hæc binas icones Pluknetii huic speciei Cl. Lin-  
næus applicavit. Prior male depicta a Pluknetio; posterior  
aliam plantam exhibet.

Nostra species semper habet umbellas multifloras.

## PAPILIO (*Thoas*) TAB. XXI.

PAPILIO (*Thoas*) alis caudatis: supra nigris: fasciis dua-  
bus flavis interruptis, subtus flavis fascia cœrulea. Linn.  
Mantiss. (2) 536.

## ANAGALLIS (*Latifolia*) TAB. XXII.

ANAGALLIS (*Latifolia*) foliis cordatis amplexicaulibus,  
caulibus compressis. Linn. sp. pl. 212.

Cruciata montana minor flore cœruleo Barr. ic. 584. fig. mala.

## PAPILIO (*Ricini*) TAB. XXII. Mas. & Femina.

PAPILIO (*Ricini*) alis oblongis integerrimis fuscis: primo-  
ribus utrinque fasciis duabus flavis. Linn. Syst. Nat. 756.

## SAXIFRAGA (*Stolonifera*) TAB. XXIII.

Foliis ovato-rotundatis, dentatis, crassis primoribus sub-  
tus rubris caule thyrsi floreo: scapo aphylo.

Cal. persistens monophyllus, 5. partitus, patens, laciniis  
ovatis acutis tribus: superioribus minoribus.

Cor. irregularis 5. pedata, pentaphylla, petalis tribus supe-  
rioribus ovatis surrectis, planis, maculis roseis inferioribus  
duabus deflexis, triplo majoribus, immaculatis niveis; ne-  
ctar. coronula glandulosa.

Stam. fil. decem filiformia antheræ parvæ bilobæ caducæ.

Pist. germ. duo ovata, styli duo, stigmata parva obtusa.

Habitat in Virginia.



**PAPILIO** (*Polymnia*) TAB. XXIII.

**PAPILIO** (*Polymnia*) alis oblongis integerrimis luteis; primoribus fascia flava; posticis fasciis tribus nigris. Linn. Syst. Nat. 755.

**RIBES** (*Cynosbati*) TAB. XXIV.

**RIBES** (*Cynosbati*) aculeis subaxillaribus, baccis aculeatis racemosis. Linn. Sp. pl. pag. 292.

Facies R. Uvæ crispæ, folia parum fissa. Aculeis instar spinæ sub alis Pedunculi sæpius triflori. Germen inflore hispidum, nec aculeatum. Corolla R. Grossulariæ Baccæ magnitudine nucis coryli undique armatæ aculeis robustis.

**PAPILIO** (*Psidii*) TAB. XXIV.

**PAPILIO** (*Psidii*) alis oblongis integerrimis fuscis; primoribus fasciis tribus; posticisque duabus hyalinus. Linn. Syst. Nat. 756.

**PÆONIA** (*Tenuifolia*) TAB. XXV.

**PÆONIA** (*Tenuifolia*) foliis linearibus multipartitis. Linn. Sp. pl. pag. 748.

Radix repens. Folia Delphinii grandiflori S. Anthoræ, supra decomposita multipartita in lacinias numerosas, linearis lævis. Flos terminalis P. officinalis sed minor, pedunculatus solitarius. Caulis neque ramosus. Verbo quasi Filia Pæoniæ, ex Adonide apennina.

**PAPILIO** (*Pasithoe*) TAB. XXV.

**PAPILIO** (*Pasithoe*) alis nigris albo subradiatis puncto centrali albo; posticis subtus luteis basi cruentatis. Linn. Syst. Nat. 755.

## SIDERITIS (*Hirsuta*) TAB. XXVI.

SIDERITIS (*Hirsuta*) foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis, bracteis dentato spinosis, caule hirsuto, spicis interruptis elongatis. Linn. Sp. pl. pag. 803.

Caulis, rigidus, pilosus, folia lanceolata, obtusiuscula, rugoso-plicata, ferraturis 3. S. 4. subacutis. Bractearum cordatarum ferrato-spinosarum. Verticilli remotissimi, sessiles, sexflori, caule inter verticillos hirsutiores. Corolla flava tubo incurvo; Labio superiore lineari, semibifido, reflexo, erecto, nereo L inferiore minimo, calyces hirti, spinis 5. æqualibus, stamina intra tubum.

## PAPILIO (*Orestes*) TAB. XXVI.

Alis posticis rotundatis subdigitatis, omnibus nigris utrinque fascia lata continua flava inferioribus maculatis, varie coloratis. Centrum omnium alarum occupat fascia continua lata, amœna flavicans, alarum secundarum supra seriebus binis margini parallelis ex maculis lunulatis cordiformibusque flavis infra alarum secundarum ab articulo usque ad medium flavarum, cæterum atrarum seriebus, tribus, parallelis margini ex maculis cordiformibus, ac lunulatis; harum prior series rubro tincta, media cœrulea & extremo flavo est, reliquum corpus & alarum nigerrimo colore umbuuntur.

## SIDERITIS (*Perfoliata*) TAB. XXVII.

SIDERITIS (*Perfoliata*) herbacea hispido-pilosa, foliis superioribus amplexicaulibus Linn. Sp. pl. pag. 802.

Caulis erectus, herbaceus, Folia inferiora caulis petiolata, superiora sessilia, opposita, amplexicaulia. Floralia cordata, integerrima, acuminata; corollæ albæ venis aliquot rufis.

## PAPILIO (*Echion*) TAB. XXVII.

PAPILIO (*Echion*) alis bicaudatis supra fuscis; subtus pallescentibus: fascia rufa ocelloque terminali rubro. Linn. Syst. Nat. 788.



## SIDERITIS (*Lanata*) TAB. XXVIII

SIDERITIS (*Lanata*) foliis cordatis obtusis villosis, calycibus muticis lanatis, spica longa, caule erecto. Linn. Sp. pl. pag. 804.

Planta spithamœa, erecta, tota lanata. Caulis simplicissimus. Folia cordata, subsessilia, obsolete crenata, obtusa, spica longior ipso caule, sessilis, terminalis e Verticillis sexfloris, remotis, valde lanatis. Corollæ atrovioleæ, longitudine calycis, Bractææ ovatæ, obsolete ferratæ, lanatæ.

## PAPILIO (*Chrysippus*) TAB. XXVIII.

PAPILIO (*Chrysippus*) alis integerrimis fulvis margine nigro punctis albis, posticis disco punctis nigris Linn. Syst. Nat. 767.

## LOTUS (*Arabicus*) TAB. XXIX.

LOTUS (*Arabicus*) leguminibus cylindricis aristatis, caulibus prostratis, pedunculis trifloris, bracteis monophyllis. Linn. Mantill. 104.

Pedunculi primi uniflori sunt.

## PAPILIO (*Teucer*) TAB. XXIX.

PAPILIO (*Teucer*) alis subrepandis lividiusculis, subtus nebulosis; posticis ocellis tribus: postremo maximo. Linn. Syst. Nat. 753.

## BALTIMORA (*Alata*) TAB. XXX.

Caule alato decurrens foliis oppositis lato lanceolatis pedunculatis acuminatis ferratis.

Crescens ad 8. pedum altitudinem Coreopsis alternifoliam simulans.

Habitat in america septentrionali.

## PAPILIO (*Orestes*) TAB. XXX. Subtus conspecta.

**ARALIA** (*Nudicaulis*) TAB. XXXI.

**ARALIA** (*Nudicaulis*) caule nudo, foliis binis ternatis  
Linn. sp. pl. pag. 393.

Christophoriana, Virginiana zarzæ radicibus furculosis & fungosis. Pluk. alm. 98. t. 238. fig. 5. fig. mala.

**PAPILIO** (*Euterpe*) TAB. XXXI.

**PAPILIO** (*Euterpe*) alis oblongis integerrimis nigris albo-punctatis fascia fulva. Linn. Syst. Nat. 756.

**TRADESCANTIA** (*Cristata*) TAB. XXXII.

**TRADESCANTIA** (*Cristata*) repens lævis spathis diphyllis imbricatis. Linn. Syst. Nat. 3. pag. 233.

*Commelina cristata* sp. pl. pag. 64.

Radix annua, caules teretes, læves, ramosi, diffusi, repentes, folia lanceolata recurvata, lævia, basi vaginantia, vaginis striatis, spathæ imbricatæ, diphyllæ, bifloræ, floribus sessilibus, lunatæ, sexparium, secundæ Cal. corolla brevior. Petala 3. ovata, sessilia, cœrulea filamenta pilosa extus; pilis cœruleis articulatis. Stylis clavatis stigma tubulosum, crenatum.

**PAPILIO** (*Agenor*) TAB. XXXII.

**PAPILIO** (*Agenor*) alis dentatis nigris basi sanguineis: primoribus striatis; posticis disco albo maculis nigris. Linn. Syst. Nat. 747.

**OENOTHERA** (*Fruticosa*) TAB. XXXIII.

**OENOTHERA** (*Fruticosa*) foliis lanceolatis subdentatis, capsulis pedicellatis acutangulis, racemo pedunculato  
Linn. sp. pl. p. 492.

Calyx purpurascens, tetraphyllis, sed rumpitur altero sæpius & unico latere. Tubus filiformis, angustissimus, capsula angulis 4 acutis compressis folia rarius denticulata.

**PAPILIO** (*Cardamines*) TAB. XXXIII.

**PAPILIO** (*Cardamines*) alis integerrimis rotundatis albis: primoribus medio fulvis; posticis subtus viridi nebulosis  
Linn. Syst. Nat. 761.



## OENOTHERA (Parviflora) TAB. XXXIV.

OENOTHERA (*Parviflora*) foliis ovato-lanceolatis planis, caule lævi subvillosa. Linn. sp. pl. pag. 492.

Fructus apex coronatus margine octifido, nec quadrifido, uti OE. biennis, cui simillima. Caulis pilis adspersus, sed absque tuberculis ad eorum basin. Folia repanda-subdentata, minus mollia. Calyx tubo suo quadruplo brevior, infra apicem denticulo notatus, hinc ante explicationem mucrones in hac distantes Petalorum latera distantia, dimidio minora præcedentis petalis.

Capfulæ quadrivalves.

## PAPILIO (Marfyas) TAB. XXXIV.

PAPILIO (*Marfyas*) alis bicaudatis supra cœruleis; subtus cœrulescentibus punctis nigris. Linn. Syst. Nat. 788.

## OENOTHERA (Longiflora) TAB. XXXV.

OENOTHERA (*Longiflora*) caulibus simplicibus pilosis, petalis distantibus bilobis. Linn. Mantiss. 2. 227.

Folia Radicalia numerosa, lanceolata, denticulata, pubescentia costa alba, oblique nervosa.

Caules sæpius 5., enati infra folia radicalia, simplicissimi, adscendentes, hirti, virides, pilis longis, patulis albis.

Caulis centralis serius excrescit.

Folia caulina ovato oblonga, denticulata, sessilia, radicalibus similia.

Flores axillares superiorum foliorum, germine calyceque piloso.

Calyx tubo insigniter elongato, limbo suo triplo longior.

Petala 4, flava, obcordata, biloba, magnitudine OE. onagræ, si non majora, lateribus distantia; altero die rubra.

Fructus similes OE. onagræ, sed longior, inferne angustior, ore connivente minus scabro.

Differt ab OE. onagra, quæ foliis caulinis subnudis, subpetiolatis, caule erecto, ramis lateralibus, vix manifeste pilosis - Petalis approximatis, vix emarginatis, nec bifidis; calycis tubo vix laciniis duplo longiore.

PA-

**PAPILIO** (Dido) TAB. XXXV.

**PAPILIO** (*Dido*) alis dentatis oblongis nigris viridi maculatis, posticis fascia maculisque septem transversis cœrulescentibus. Linn. Syst. Nat. 782.

**SAPONARIA** (Porrigena) TAB. XXXVI.

**SAPONARIA** (*Porrigena*) calycibus cylindricis pubescentibus, ramis divaricatissimis, fructibus pendulis. Mantiss. (2) 239.

*Silene porrigens* Syst. 3. p. 230.

*Lychnis chalepensis* annua, foliis parum hirtis angustis, flosculis carneis, pediculis infirmis biuncialibus capsulis fere rotundis Moris. hist. 3. p. 541. fig. mala.

Caulis bipedalis, erectus, articulatus, rigidulus, inferne glaber, superne pubescenti viscidus ramis divaricatissimis.

Folia lanceolata: inferiora glabra; superiora sub ramificationibus pubescentia viscida.

Pedunculi axillares, solitarii uniflori, capillares, laxi patentes glabri, longitudine foliorum, dum fructiferi penduli.

Calyx oblongus, tubulosus, pubescenti-viscidus.

Petala absque corona, subincarnata, emarginata laciniis brevibus Stam. alba, tubo breviora, Germen ovatum. Styli distantes.

Stigmata simplicia.

Obs. Deleatur inter *Silenes*; substituatur hæc descriptio e viva.

**PAPILIO** (Daplidice) TAB. XXXVI.

**PAPILIO** (*Daplidice*) alis integris rotundatis albis margine fuscis. subtus luteo griseis albo maculatis Linn. Syst. Nat. 760.

**CODON** (Royeni) TAB. XXXVII.

Cal. perianthium monophyllum, decempartitum foliolis subulatis, persistentibus erectiusculis: alternis brevioribus.

Cor. monopetala campanulata basi torulosa: Limbo decempartito æquali, Nectarium decem locale ex squamis 10. unguibus staminum infertis, conniventibus, receptaculum tegentibus.

Stam. filamenta decem, longitudine corollæ. Antheræ crassæ.

Pist. Germen superum conicum, stylus simplex, longitudine staminum, stigmata duo, longa, setacea, divergentia.



Per. biloculare.

Sem. plura subrotunda hirta in pulpa exsucca colorata.

Caulis herbaceus, firmus, cubitalis, teres ramis affurgentibus, folia alterna petiolata cordata ovata, subrepanda, indivisa, acuminata, subcoriacea glabra supra avenia, Flores supra axillares, solitarii, pedunculati, facies corollæ Atropæ Belladonnæ albidi, extus notati striis 10. purpurascentibus Herba tota adpersa striis Royeni Linn. Syft. Nat. 3. 292.

**PAPILIO** (Marfyas) TAB. XXXVII.

**PAPILIO** (*Marfyas*) (subtus conspecta) Linn. Syft. Nat. 788.

**THEA** (Bohea) TAB. XXXVIII.

**THEA** (*Bohea*) floribus hexapetalis Linn. sp. pl. pag. 734.

**PAPILIO** (Hippothoe) TAB. XXXVIII.

**PAPILIO** (*Hippothoe*) alis integerrimis supra fulvis immaculatis; subtus cinerascentibus: punctis ocellaribus nemorosis. Linn. Syft. Nat. 793.

**SENECIO** (Chrysocoma) TAB. XXXIX.

Corollis nudis foliis longioribus linearibus, prælongis.

Habitat ad Promontorium bonæ spei.

Planta fruticosa floribus corymbosis, folia, priora in planta juniore sunt folia coronopi.

**PAPILIO** (Clio) TAB. XXXIX.

**PAPILIO** (*Clio*) alis oblongis integerrimis fuscis: primoribus albo maculatis; posticis fascia alba Linn. Syft. Nat. 751.

**GORTERIA** (Arancosa) TAB. XL.

Foliis integris dentato spinosis, amplexicaulibus, ramis alternis, floribus pedunculatis luteis subtus violaceis.

Habitat ad Promontorium bonæ spei.

**PAPILIO** (Anthilochus) TAB. XL.

**PAPILIO** (*Anthilochus*) alis caudatis concoloribus flavis: facciis margineque nigris, caudis albis longitudine alæ Linn. Syft. Nat. 751.

## CYANNELLA (Capensis) TAB. XLI.

Cor. Hexapetala petalis 3. inferioribus propendentibus stamen infimum declinatum longius. Linn. Syst. Nat. 243. Videt. plukt. phyt. 434. fig. mala.

## PAPILIO (Polyxena) TAB. XLI.

PAPILIO (*Polyxena*) alis caudatis, supra purpureo nigra, alis promoribus, maculis albis duabus minimis subtus nebulosis.

Habitat in America.

## SOPHORA (Tinctoria) TAB. XLII.

SOPHORA (*Tinctoria*) foliis ternatis subsessilibus foliolis obovatis glabris. Linn. Sp. pl. pag. 534.

## PAPILIO (Ulysses) TAB. XLII.

PAPILIO (*Ulysses*) alis caudatis nigris disco coeruleo radiante; posticis subtus ocellis septem. Linn. Syst. Nat. 748.

Alæ primores atræ: a basi ad medium macula cœrulea septem-dentata: maculis 7 fuscis lanceolatis parallelis in parte alarum nigra simul aream cœruleam intrantibus.

## ROYENA (Villosa) TAB. XLIII.

ROYENA (*Villosa*) foliis cordatis oblongis subtus tomentosis.

Simillis Royena lucida sed rami villosi Folia elliptica, oblongo, basi cordati subtus tomentosa, obtusiuscula, breviter petiolata petiolis villosis, Flores axillares, nutantes, solitarii pedunculis villosis longitudine florum Bractææ 2, oppositæ, ovatæ, acutæ, pubescentes, calyce majores eo-que subjectæ deciduæ. Linn. Syst. Nat. T. 2. pag. 302.

Habitat. ad. cap. b. spei.



**PAPILIO** ( *Kollina* ) TAB. XLIII.

**PAPILIO** ( *Kollina* ) alis angulatis dentatis nigris , primoribus omnibus supra maculis cœrulea.

Magnitudine. Pap. Polychloros.

Habitat in Asia: China.

**LYTHRUM** ( *Petiolatum* ) TAB. XLIV.

**LYTHRUM** ( *Petiolatum* ) foliis oppositis linearibus petiolatis , floribus dodecandris. Linn. Sp. pl. 641.

Anonymos flore purpureo ringenti , galea bipartita labio quadripartito feminibus vasculoso inclusis , caule viscoso.

Florem habet tenerum & citissime marcescentim , mane solummodo conspicuum Clayt. n. 418.

Folia lanceolata , opposita , integerrima , caulis pubescens viscosus Flos ex singula ala solitarius , calyx tubulosus , oblongis , ventricosus , ore obsolete minimo sexifido.

Petali sex , tenuia oblongo. Stamina duodecim , sex ad singulum latus.

Pistillum unicum. Stigma capitatum.

Cuphea erecta foliolis oblongis - ovatis oppositis spicatis terminalibus. Brown. jam. 216.

**PAPILIO** ( *Philea* ) TAB. XLIV.

**PAPILIO** ( *Philea* ) alis integerrimis angulatis flavis : primoribus macula ; posticis limbo luteis Linn. Syst. Nat. 764.

**TEURIUM** ( *Cubense* ) TAB. XLV.

**TEURIUM** ( *Cubense* ) foliis ovatis incisis glabris subcuneatis , floribus solitarius pedunculatis Linn. Mantiss. pl. pag. 80.

Habitat in cubæ humidiusculis.

Caulis erectus , glaber , inodorus. Flores albi.

PA-

**PAPILIO** (*Dirce*) TAB. XLV.

**PAPILIO** (*Dirce*) alis angulatis fuscis, primoribus fascia flava: subtus nigro undulatis Linn. Syft. Nat. pag. 778.

**ALYSSUM** (*Hyperboreum*) TAB. XLVI.

**ALYSSUM** (*Hyperboreum*) foliis incanis dentatis, staminibus quatuor bifurcatis. Linn. Sp. pl. pag. 910.

**Lunaria** foliis ellipticis incondite denticatis Kraschen. act.

Petr. 1747. p. 381. t. 15. fig. 1. mala.

Stamina 2. breviora ungue acuto notata, reliqua 4. ad basin squama emarginata.

**PAPILIO** (*Bixæ*) TAB. XLVI.

**PAPILIO** (*Bixæ*) alis rotundatis fuscis basi viventibus: posticis subtus fascia lactea. Linn. Syft. Nat. 795.

Pap. Mas. sæpe caudata.

**OTHONNA** (*Tagetis*) TAB. XLVII.

**OTHONNA** (*Tagetis*) foliis linearibus pinnatis subdentatis, caule herbaceo. Linn. Sp. pl. 1309.

**PAPILIO** (*Phidias*) TAB. XLVII.

**PAPILIO** (*Phidias*) alis rotundatis atris nitentibus margine albis ore anoque rubris. Linn. Syft. Nat. 795.

**CINERARIA** (*Linifolia*) TAB. XLVIII.

**CINERARIA** (*Linifolia*) pedunculis unifloris foliis sparsis caule fruticosa. Linn. Spec. pl. 1244.



Caule fruticosus , compositus , scaber folia confertissima , linearia angustissima , virida pedunculis solitarii , uniflori , filiformes , foliis longioribus. Amœn. Acad. 6. afr. 82. Flores parvi lutei.

**PAPILIO** (Aonis) TAB. XLVIII.

**PAPILIO** (*Aonis*) alis angulatis griseis : primoribus flavescenti nebulosis : supra ocellis sesquialteris Linn. Syst. Nat. 769.

**HELIANIUS** (*Angustifolius*) TAB. XLIX.

**HELIANIUS** (*Angustifolius*) foliis alternis linearibus Linn. Sp. pl. 1279.

**PAPILIO** (*Quercus*) TAB. XLIX.

**PAPILIO** (*Quercus*) alis subcaudatis supra cœruleis ; subtus cinereis linea alba , puncto ani gemino fulvo. Linn. Syst. Nat. 788.

**LEEAE** (*Crispa*) TAB. L.

**LEEAE** (*Crispa*) caule angulato fimbriato. Linn. Mantiss. pl. 125.

Radix tuberosa , caulis sublignosus , annuus , articulatus , tripedalis , angulis membranaceis crispis , Folia alterna , pinnata , rachi marginata : foliolis petiolulatis. 3. f. 5. ovali-oblongis , lineatis , glabris argute ferratis , nervis transversis , intertextis striis transversis parallelis. Stipulae solitariae , subfolia , feminulares , carina ciliata. Pedunculus corymbosus. Flores nivei exigui. Utriusque speciei. Nervi oppositi sunt.

**PAPILIO** (*Dejanira*) TAB. L.

**PAPILIO** (*Dejanira*) alis dentatis fuscis : primoribus utrinque ocellis quinque ; posticis sex fasciaque alba repanda. Linn. Syst. Nat. 774.

**PÆNNÆA** (*Longiflora*) TAB. LI. Fig. 1.

**PÆNNÆA** (*Longiflora*) foliis oppositis rhomboideis acutis floribus quadrifidis purpureis, tubo longissimo.

**PÆNNÆA** (*Cneorum*) TAB. LI. Fig. 2.

**PÆNNÆA** (*Cneorum*) foliis lanceolatis acutis.

**PÆNNÆA** (*Mucronata*) TAB. LI. Fig. 3.

**PÆNNÆA** (*Mucronata*) floribus parvis rubris foliis cordatis acuminatis. Linn. Sp. pl. pag. 162.

**PAPILIO** (*Caricæ*) TAB. LI.

**PAPILIO** (*Caricæ*) alis integerrimis fulvis disco communi albo, limbo cinereo ocellato. Linn. Syst. Nat. 792.

**ECHIUM** (*Capitatum*) TAB. LII.

**ECHIUM** (*Capitatum*) caule piloso floribus capitato corymbosis æqualibus, staminibus corollæ longioribus, foliis hispidis. Linn. Syst. Vegt. Sp. pl. pag. 189.

Caulis lignosus ramosus pilosus. Folia lanceolata, adspersa fetis patulis, pellucidis, basi bulbosis.

Flores dense in capitula terminalia congesti. Corollæ regulares, infundibuliformes, vix Lycopsidis majores.

Stamina corollis & stylus staminibus duplo longior. Mantiss. Spec. Lin. pag. 42. D. Royen.

**PAPILIO** (*Amathea*) TAB. LII.

**PAPILIO** (*Amathea*) alis angulatis, supra fuscis albo punctatis, fascia rubra, linea nigra undata. Linn. Syst. Nat. pag. 779.

**CYRILLA** (*Racemiflora*) TAB. LIII.

Caule ramisque compositis ex apicibus annotinis tantum ramosis. Folia alterna petiolata, exstipulata, lanceolata (Ligustri), integerrima, glabra, supra subtilissime venosa.

Racemi plures terminales, rami præcedentis anni penduli, spithamæi, bracteis fetaceis, longitudine pedicellorum.

Flores albi; Petala disco longitudinali villosa.

Difficile hæc arbor distinguitur. Sunt, qui illam Celasrum vocant; sunt qui Hirtillam dicunt: quæ hoc tempore Hortum Academicum ornat, mihi Cyrilla racemiflora videtur. Mantiss. Spec. Linn. pag. 50. PA.



PAPILIO (*Amathea*) TAB. LIII.

PAPILIO (*Amathea*). Linn. Syft. Nat. pag. 779.

STAPELIA (*Tuberosa*) TAB. LIV. Fig. 1.

STAPELIA (*Tuberosa*) Folia lanceolata undulata ciliata.  
Radix fimillima radici Cyclaminis.

Char. cum Echitide multum convenit.

Habitat ad Caput Bonae spei.

COLUMNEA (*Humilis*) TAB. LIV. Fig. 2.

COLUMNEA (*Humilis*) foliis petiolatis dentatis, sæpe ternatis, subtus rubris, floribus rubris.

PAPILIO (*Tipha*) TAB. LIV.

PAPILIO (*Tipha*) alis subcaudatis nigris: primoribus maculis duabus: posticis disco rubro-emarginato albis.

Linn. Syft. Nat. pag. 776.

EUPHORBIA (*Procumbens*) TAB. LV.

Radix tuberosa extus rugosa, fusca, Cyclaminis radici similima.

Ramuli rariores nudi, lineis exarati, aculeis instructi procumbentibus. Habitat ad Cap. Bon. Spei.

D. Thunberg misit ad Hortum Lugd. Bat.

PAPILIO (*Oenone*) Tab. LV.

PAPILIO (*Oenone*) alis denticulatis, primoribus albido maculatis, subbiocellatis, posticis basicyaneis ocellis duobus  
Linn. Syft. Nat. 770.

# INDEX GENERUM PLANTARUM.

Alyffum.	Tab. 46.	Impatiens.	Tab. 10.
Amaryllis.	Tab. 13.	Leca.	Tab. 50.
Anagallis.	Tab. 22.	Lobelia.	Tab. 20.
Aralia.	Tab. 31.	Lotus.	Tab. 29.
Baltimora.	Tab. 18 — 30.	Lythrum.	Tab. 44.
Boerhavia.	Tab. 21.	Manulea.	Tab. 8.
Browallia.	Tab. 14 — 15.	Martynia	Tab. 7.
Celastrus.	Tab. 12.	Oenothera.	Tab. 33. 34. 35.
Cineraria.	Tab. 48.	Othonna.	Tab. 47.
Codon.	Tab. 37.	Pennæa.	Tab. 51.
Columnnea.	Tab. 54.	Poeonia.	Tab. 25.
Commelina.	Tab. 4.	Ribes.	Tab. 24.
Coreopsis.	Tab. 19.	Royena.	Tab. 43.
Croton.	Tab. 9.	Salvia.	Tab. 3.
Crotolaria.	Tab. 17.	Saponaria.	Tab. 36.
Cyanella.	Tab. 41.	Saxifraga.	Tab. 23.
Cyrilla.	Tab. 53.	Selago.	Tab. 8.
Cytifus.	Tab. 16.	Senecio.	Tab. 39.
Dais.	Tab. 6.	Sideritis.	Tab. 26. 27. 28.
Echium.	Tab. 52.	Sophora.	Tab. 42.
Euphorbia.	Tab. 55.	Stapelia.	Tab. 54.
Gorteria.	Tab. 40.	Teucrium.	Tab. 45.
Hediotis.	Tab. 2.	Thœa.	Tab. 38.
Helianthus.	Tab. 49.	Tradescantia.	Tab. 32.
Hyoscyamus.	Tab. 5.	Veronica.	Tab. 11.
Jasminum.	Tab. 1.		

# INDEX PAPILIONUM.

Papilio. Helenus.	Tab. 1.	Papilio. Teucer.	Tab. 29.
—— Polydamus.	Tab. 2 — 3.	—— Euterpe.	Tab. 31.
—— Troilus.	Tab. 4 — 7.	—— Agenor.	Tab. 32.
—— Mnemosyne.	Tab. 5.	—— Cardemini.	Tab. 33.
—— Piera.	Tab. 6.	—— Marfyas.	Tab. 34 — 37.
—— Pammon.	Tab. 8.	—— Dido.	Tab. 35.
—— Demophon.	Tab. 9 — 11 — 15.	—— Daplidice.	Tab. 36.
—— Sektator.	Tab. 10.	—— Hippothoc.	Tab. 38.
—— Demoleus.	Tab. 12.	—— Clio.	Tab. 39.
—— Hecabe.	Tab. 13.	—— Antilochus.	Tab. 40.
—— Ulyffus.	Tab. 14 — 20 — 42.	—— Polyxena.	Tab. 41.
—— Scylla.	Tab. 16.	—— Kollina.	Tab. 43.
—— Melpomene.	Tab. 17.	—— Philia.	Tab. 44.
—— Philoſtitiſ.	Tab. 18.	—— Dirce.	Tab. 45.
—— Æneas.	Tab. 19.	—— Bixæ.	Tab. 46.
—— Thoas.	Tab. 21.	—— Phldias.	Tab. 47.
—— Ricini.	Tab. 22.	—— Aonis.	Tab. 48.
—— Polymnia.	Tab. 23.	—— Quercus.	Tab. 49.
—— Pfidii.	Tab. 24.	—— Dejanira.	Tab. 50.
—— Paſithoe.	Tab. 25.	—— Caricæ.	Tab. 51.
—— Oreſtiſ.	Tab. 26 — 30.	—— Amatheæ.	Tab. 52 — 53.
—— Echion.	Tab. 27.	—— Tipha.	Tab. 54.
—— Chryſipus,	Tab. 28.	—— Oenone.	Tab. 55.





TAB I.



N. Keesburgh Scit.



Plaat S.

Melenius. Ridder-kapel, met gestuurde wieken,  
die zwart (of donkerbruin) zijn, de agtersten met een  
witte stak en van anderen drie witagtige, en zeven  
ijzergrauwe (of oranje-kleurige) maantjes.  
zie Houttuyn Natuurlijke Historie volgens Linnéus.  
1 deel. 4<sup>de</sup> Stuk. Plaatje 191 (a) en pl. 07. fig. 3.  
voort in trio

Alle de Kapellen op de 55 platen van dit werk  
afgebeeld behooren volgens Linnéus tot de Dag-Kapellen.

TAB I.



N. Kienburg Scit.





TABII



## Plaat 2.

*Polydama L.* Ridderkapel, die de ricken getand en zwart of bruin heeft, met een afgebrooken geelen band, bestaande uit evenwijdige pijlwyze vlakken; de agterkten, van onderen, wit geleeckend. *Wiedtuyt* ii buk bl. 195 (ii.) & *Sherian* *Surinaamseke* *insec-*  
*ten* pl. 31. De Rups aatt op de *chineesche* *Ros.* een boompje dat tot de *althia* betrokken wort en *America*. Deze Kapel is van boven verbeeld zie dezelve van onderen op de volgende 3 plaat.

TABII



*N. Moench, del. & sculp.*





TAB. III.



N. Meenburch fecit

### Plaat 3

Polydamus Gezele Ridderkapel, die op de voorgaande  
plaat van boven vertoond is, van onderen te zien, zijnde  
aldaar bruin met 5 gele vlekken, op de voorvleugel,  
en 7 borstige rode vlekken op de achtervleugel.  
en volgens Linné met 7 lijnrecht lopende, en 3 borstige  
vlekken, hoog-rood van kleur. Hutt. II Plak Pl. 195 (II)  
Merian Sur. insecten pl. 31.






N. Meenburgh fecit



TAB. IV.



N. Meuburg Leaf



Plaat 4

*Troilus*. Rieder kapot met gestaarle wicken die  
zwart zijn, de voorsten gerand met agt en de  
agtessten met zeren bleike stippen, en twee gele  
vlakken van boven te zien. *Hiüttuon II Huk II. 192. (5)*  
zie derselre van *Lunderen* plaat 7. voort in de *fincken*

TAB. IV.



N. Meisburg Scit





TAB. V.



Plaat 5.

Mnemosyne. Een Titulandfche Kapel die tot de  
Paarus Kapellen behoort, die de wicken ongekarteld,  
langwerpig, wit met zwarte aderen heeft, de wortten  
met twee zwarte rinksen aan den rand. Hüttuyn  
II. Stuk Pl. 220. 12.

Deze afgebeelde Kapel heeft drie vlakken op de  
voor en twee op de agtervleugelen ende binnenrand  
der agterflen mede zwart, ende buitenflen heeft  
groenagtig.

TAB. V.



N. Meemburg, scit.





1B. VI



1 N. Meerburg's Kunst

Plaat 6


Piera. De Glat kapel. een Janna's kapel  
die de vieren Lungverpzig, ongekarteld, al' glat  
dooriijgende heeft, de agterken met twee  
roepers. Bloutlijn II Luk Fil 229. 13.



*C. Moorburgii* L.








Plaat. 7.

12. 1811. Deene Ridder kapel van Eren afgevee.  
Plaat 4. is van anderen: alhier gelukend, bruin,  
met twee reien witte stippen op de voorsteijelen, en  
op de achteren een schone blaauwen rand en zeven  
afgevee vanden zijden zijde van de rene uit de Indien  
Houllun II. 1811. 192. (5.)









TAB. VIII.



N. Meerburg's Teit

Plaat P.

Pammon. Ridder-kapel met gestaarte wicken,  
die wederzyds zwart of bruin zijn, allen aan den  
rand geslakt, de aglenken met een bånd van  
zeeren witte vlakken. Houttuyn II stuk Pl. 193. (P.)  
voort in Griek

TAB.VIII.



N. Meerburch fecit





TAB. IX



Plaat. 9.

Demophon. Ridderkapel die de wieken geland  
heeft; van boven zwart met een groenen band,  
van onderen orrauw gemarmere. Houttuyn  
ii Stuk Pl. 210 36. zie Roet 4 deel plaat 6.  
figuur 1. waan, itupnelyk + wijffe.


TAB. IX



N. A. Menckel fecit







Plaat. 10.

*Sectator*. een Nymph-Kapel, de voorsten vleken  
van boven bruin met zwarte aderen, de agtersten  
zwart met hemelblauwe vlakken; van onderen  
de vier vleugelen van 't lijf af geel met zwarte  
aderen, met een breeden bruinen rand, en op  
de agtersten twee zwarte oogjes.  
zie dezelve van boven vliegende en van onderen  
zittende.





*N. Heerbusse* recit





TAB. XI



*N. Meenburgh fecit*

Plaat 33

Demophon. 4 mannetje. Ridder kapel die de wieken  
rondachtig heeft, van boven zwart met een blaauwen  
band en twee blaauwe vlakjes aan de einden der  
voorleugelen. Houttuyn II Pluk Pl. 210. (36.)  
Linnaeus noemt de binnē groen  
zie de rebrē kapel van onderen plaat 15.

TAB XI




*N. Meenburgh fecit.*





B. XII.



*H. Meenburch fecit.*


Demoleüs. Ridder Kapel die de rijken getoone  
 en bruin heeft, met gele stakken, en een geel-  
 stankigen band, de agtersten ieder met twee  
 rozen en met een blaauw half maantje en  
 een oranje-keurig oog. (Plaat II. N<sup>o</sup> 217. 35.)  
 Deze Kapel is mij gemeen in China en men  
 heeft er ook verscheiden leden van in de ridders  
 en aan de Kaas.



*H. Meenburgh fecit*







*N. Meerburg fecit*

Plaat 13.

*Micabe*: een Danaïd-kapel, die de wiken  
mid van rand en geel heeft; aan de buitenkant  
zwart of bruin, van onderen met bleke stippen.  
Dit is een soort van kleine geel witte uit China  
of de oost-indië. *Floutteyn II fluk II. 266 74.*



N. Meerburg fecit








Plaat 14.

Vlijfsel. Dit is een batterd vlijfsel. Een Ridderkapel die de wiken van boven bruin heeft met een blauwen band in de midden, en betonen den rand vele vele vlakjes van anderen. ligt bruin met grote vlakken, en wederzijds op de voorste wiken en op de achterste en oogen. Houttuyn II stuk II. 201 (20.)  
Deze kapel is alhier van anderen afgeveeld, en op plaat 20. van boven. maar de egte vlijfsel op plaat 42.



*H. Meunier & Fecit*







## Plaat 15.

Demophore. 1 mannetje. een Ridder-kapel.  
 die de wiken rondagtig heeft, van boven zwart  
 met een blaauwen band en twee blaauwe vlakjes  
 aan de einden der voorleugelen, van onderen  
 graauw gemarmerd. en tusschen den rand der  
 agtersten wiken rijt witte stippen, met een  
 rood-agtig vlakje. boven elke stip het vijfje  
 heeft twee vogels. Flouttuyn II Stuk bl. 210. (36.)  
 Deze kapel is alhier van onderen afgebeeld,  
 zie dezelve van boven. plaat 11.

TAB XV




*W. Meuburg & fecit*






TAB. XVI



*N. Mearns's facts*

Plaat. 16.

Scijla. Oost-indiſche Boter-kapel. Danaüs-kapel  
die de voortlen wieken wit heeft, met een zwarten of  
bruinen rand, de agterſten geel of boter-kleurig; van  
onderen geheel geel, met bruine ſteppen. *Wuttuyn*  
" *Stuk II 256.* als eene verſcheidenheid van *Damme*  
(69) zie dezelve om hoog van de bovenzijde, en van  
onderen aan de onderzijde afgebeeld.









N. A. Mearns del.

Num 17.

Alpome . Rood gevlocht Jurnal kapel. die de  
wiken langwerpig, sukkerveld, zwart heft aan den  
binnenkant van anderen rood, de wassen wider  
zijds met een roden band, uit west indien.


Houtbryn II Hout II 235. (55.) zie Roefel II deel  
p. 3. figuur 6.












Plaat 10.

*Philoctetüs*. Ridderkapel die de wiken zwart  
en bruin heeft, de agterflen van boven met  
twee hemelſch blaauwe vlakken, in t midden  
zwart ge-oogd. Pluutten II Stuk Pl. 220. (20.)  
vandeze indiſche kapel zyn de worten wiken  
met vier witte ſlippen en drie paarſchaglige  
vlakken, van onderend met een rege witten band,  
en een zwarten dwarsſtreep aan den grondſtaam:  
de agterflen met zwarte ſlippen en twee witte  
vlakken —







TAB. XVIII



Plaat 19.

Améas. Ridder-kapel, die de wicken  
getand en zwart heeft; de rootten van  
boren met een groenen vlak, de agter-  
sten met een geringerde vlak, die rood is.

Houttuyn II Stuk. Pl. 190. (15.)

zie Roefell 4 deel plaat 2 figuur 2.



*N. Meiburgi, L.*






BXX



N. Heerburgk fecit

Vlijfsel. Dit is een bijsoort of Bazler's Vlijfsel.  
 Een Ridder kapel die de wiken van boven Bruin  
 heeft, met een blaauwen band in t midden en  
 binnen een rand veel rode vlakke; van maeren  
 tot Bruin met veel vlakken en wederzyd. op  
 de voorsten wiken drie, en op de achtersten  
 vier oogjes. (Zie uitsn. II. stuk II. 201 20.)  
 Het kapel is alhier van boven afgebeeld,  
 en op plaat 14 van onderen, maar de eene  
 vlijfsel op plaat 42.

TABXX




N. Merdunge fecit





TABXXI



N. Maerburgk fecit

Plaat. 21.

Thöas. Ridderkapel die de waken  
geslaard en van boven bruin heeft, met  
twee gele banden, van onderen met  
veel blaauwe plakken. Lion. Mant. 530.

TABXXI




N. Haenbuegle fecit





TABXII



Plaat. 22.

*Ricini*. Geelblakkige Paanlakapfel, die de  
wieken langwerpig, ongekarteid bruin heeft. de  
vrouwen wederzyds met twee ovale banden.  
Houttuyn II Stuk II 232 (50) Herian Sur. pl. 30.

Het mannelijke heeft de wieken aan de grond-  
kleun blaauw, zie dezelve van boven op de plaat  
vliegende; het wyfje de agterkleun van de  
grondkleun of van lijf af, tot op de helft  
rood, zie dezelve aan de voet der plant  
vliegende en by Roefell 4 deel pl. 5. fig. 1  
De Ruyfen onthouden zig in Surinaam op  
het amerikaanfeh gewas *Ricinus* genaamt,  
waar van de Kapel de naam draagt.

TABXII



*N. d. calycis fructu*








*N. H. Schumacher fecit.*

Plaat 23.

*Polimnia*. Oranjekeurige Savan-kapel. Die  
de meken langwerpig, ongekarteld en bleekgeel heeft,  
de voorsten met een geelen band, de achtersten met  
drie zwarte banden Houttuyn II Pl. N. 231. (47.)  
zie Roefel 2 deel pl. 5. figuur 2. uit Sinaame.





*N. Sh. inkeruphs forit.*





TABXXIV



N. Moenchburg fecit

Plaat 2A

Psidie. Gouwen-kapfel. Ruina, kapfel, die de  
wieken langwerpig, ongekarot, bruin heeft, de  
vooslen met drie, de achtersten met twee groen-  
achtig doorschijnende banden. Houlluin II Lijk  
n<sup>o</sup> 233. 51. zie herian Luunaamfche pfeelen  
pl. 19. en Roefel II deel n<sup>o</sup> 2. figuur 3.

TABXXIV



N. Hoenburg fecit







Plaat 25.

Phasilhoe: Parnas-kapel, die de wieken lang  
werm ingekarteld en zwart heeft, met een wit-  
vlakkeigen band, en drie witte stippen op de voorleupelen.  
Linnéus. Tijl nat 755.









N. Meenburgh fecit.

Plaat 26.

Ordeet. Ridderkapel, die waken geland kort  
geflaart en zwart heeft, met een rhouwe geelen  
band, de aepelen binnen den rand met zeren  
gule binn. koppel en vier witte rindjes daar  
binnen. zie deselve van anderen plaat 30.

TABXXVI




N. Meernburgk fecit.





TABXXVII



N. Meurburg fecit

Plaat 27.

Echiön. een zwartachtig Kapelke. of Pagelke.  
die twee draadachtige staartjes heeft, aan de  
aagtersten vleugels, van onderen witachtig met  
roode oogje. Linnéus Syst. Nat. 700.  
zie voorgelyke by Plaatlijn N. 352. 126.




N. Meurburg fecit





TAB XXVIII



Plaat 20.

(Chrysippus. 1 omg. kapel die de wicken rond-  
achtig en bruinachtig geel heeft de vorsten ieder  
met acht witte vlakken en een zwarten rand,  
die wit gestippeld is. Linnéus Syst. Nat. 767

TAB XXVIII.



N. Mevburgel fecit







N. Meerburg fecit

Maat. 29.

Teucer: de Albat. Roderkapel, die de wiken  
breed, en breed. bruinaagtig heeft, van onderen  
gewolkt; de agtersten met drie oogen, waar van  
het laatste by uitslag groot is, zijnde wel een halven  
duim breed, en byna cirkel rond. Struik 11 stuk.  
H 216. (33) & Merian Luunaamsche pissen pl. 23.  
De Rups leeft op de pilsang, of Bannan, in wett indie.

TABXXIX



*N. Meerburg fecit*







N. Meerburg fecit

Plaat 30.

Orestes Riider-kapel die de meken gelane kort  
getlaart en zwart heeft van onderen geel, met  
een zwarten rand die met geel gestippeld is, om de  
wortlen, de agterflen mede geel, de buienle heeft  
zwart, waar in drie banden zijn van half maant-  
wyze slakken, de binnenste rood, de middelste blauw,  
en de buitenste geel, zie deze innere kapel  
van boven plaat. 26.



N. Meerburch fecit





TAB XXXI



*Plaat 31.*

*Euterpe. Ponte Sarnat-kapel, die de meken  
langwerpig, ongekarteld, zwart, met witte flippen  
heeft en een geelen band. Houttuyn II Auk. Pl. 232  
(ag) komt uit Brett indiën.*

TAB XXXI



N. Meerburch fecit







*N. Menziesii* Poit.

Plaat 32.

Agenor. Ridderkapel, met de rieten geland  
en zwart, aan den grondkleur blootkleur; de  
velden gestreept, de agterden en midden wit,  
en agterwaarts met vijf zwarte stukken en  
een geel rans. Houtklyn II. Huk II. 197. 13.  
men vind deze in Cotte-indien en China

TAB XXXII



A. Rehnitz fecit





TABXXXIII



N. Meerburch fecit

Plaat 33.

Cardamine L. Het Pietenkruis. Damaul-  
kapel die de wickens rood van rand en wit heeft.  
de roosfen ten halven staan, de agtersten aan  
elkaar groen gevlokt. Houduyn II Stuk II 160 (63)  
zie het manneke van boven bij de bloemen vliegen  
en het wijfje van onderen bij de plant aan de  
boven zijde vliegende, en aan de onderzijde zittende  
afgebeeld.

TABXXXIII



N. Meerburch fecit





TABXXXIV



Plaat 34.

Maarsijad. Oost indisch Kapelletje of Pagetje.  
die de wieken met twee staarten, van boven  
hemellich-blauw, met een zwarten rand heeft,  
van onderen blaauwaglig, met zwarte stippen.  
zie Houduijn II Stuk. bl. 361. (149.) s kleemant  
bijdragen op Roefel 1. deel. plaat 5. figuur. 1 en 2.  
zie dit kapelletje van onderen plaat 37.


TAB XXXIV



N. Koenigse fecit







N. M. esburg fecit

Plaat 35.

Dido. Annunus kapel. Pannas-kapel, die  
de wiken langwerpig ongekarteld zwart heeft,  
de voerflen met groenachtige banden en vlakken,  
de aglenflen met blaauwachtige vlakken. Linnæus  
Syst. nat. 702. zie Hultsch H. 235 als een  
byvoegsel onder (55.) & Herian Juven. Isidor. pl. 2.





N. M. esburg fecit





TAB XXXVI



N. Meunier fecit

Plaat 36.

Daphidice. Danaus kapel die de wicken on-  
gekarteld, rond van rand en wit heeft aan de  
grondkleur blaauwachtig, met bruine zoomen, van  
onderen geelachtig met wit gestrukt. Struiktuyn  
ii Stuk. Pl. 244. (62.) zie dezelfde van boven  
stijgende en van onderen zittende vertoone.



TAB XXXVI



N. Meunier scit







Plaat 37.

Inwerfijde. inderjche Pagelje van Eren  
hemel/klauw met een zwarten rand, van nderen  
blauwragtig met zwarte flappen. Houltuim is Luk  
H. 361 (129) en Kleemaant tydragen op Rofel  
1 deel. plaat 1. figuur 1 en 2. deene Kapel alhier  
van nderen te zien is van Eren verbeet pl. 34.











*N. Humboldt fecit*

Plaat 30.

Wippelhor. Een vuurkapelletje die de wicken  
van boven van een vuurige rode kleur heeft, met  
een bruinen rand, van anderen geel met witte  
vlakken met veel oog. Linnéus Syst Nat 193.  
Deze schijnt tot de ciervlyke Danau-kapellen  
te behooren. zie Strümpg II Pluk n. 372. 161)

TAB XXXVIII



N. Hensburgh fecit





TAB XXXIX



N. Meerburg fecit


Plaat. 39.

*Clio* Jarnal-kapel. die de vlecken langwerpig,  
ongekarteld bruin heeft, de voorsten wit gekleurd.  
de achtersten met een wit landoorzel. Moulleyn  
ii. *Stuk*. Plaat 234. (52) *Merian* Surinaamsehe  
vleeden plaat 35. van anderen vliegende verbond.

TAB XXXIX



N. Herburg fecit





TAB XXXX



Plaat 40.

Antiochus. West indische koninginne Pagie.  
Ridder kapel. die de wiken gestaart, en weder.  
zijd. geel heeft zwart gebandeerd en gesierd,  
met witte staarten, die 10 lang zijn als de  
wiek. Houtuyn II. Plak. Bladz. 209. (20.)

TAB XXXX



*Dr. Keenburgh fecit.*







N. Meuburg fecit

Plaat 41.

*Polixena*. Ridderskap die de wiken ge-  
land in purperkleurig heeft, met een breed  
zwart raan, of de wiken zwart, met een  
groten, purpere vlak in het midden van elke  
wiek; van andere gek. Zocht uit America

TAB XXXI



N. Meerburch fecit





TAB XXXII



N. Heerburg's fest.

Plaat 42.

Vlijsses. Ridderkapel, die de wieken gestaat heeft, zwart van kleur met een gestraalde hemelblauwe plek; de agterflen van onderen met zeren ovges gelijkend. Noutuyn II Stuk Pl 201. (20.) deze kapel heeft de zeren lancetwijze evenwijdige bruine vlakken die in het zwarte deel der wieken en in de hemelblauwe vlak in schieten, en het kenmerk van de vlijsses uitmaken. De Kapellen op plaat 1A en 20 schynen derhalven een byboot van de vlijsses te zijn.

TAB XXXII




N. Heerburg's fecit





TAB XXXXIII



Plaat 43.

Kollina. Ridderkapel die de wiken  
oeland enigzintt opstaart en zwart heeft,  
met een blaauwen band.  
omd in 't bica en (hina).

TAB XXXXIII



N. Meerburgi fruit







N. Meerburg fecit

Plaat 44.

*Philea*. oost-indische Citroen-kapel,  
of Orange-kapel. Danaüs-kapel, die de  
wieken ongekarteld hoekig en citroen geel heeft  
de roosfen met een orange kleurige plek en  
de achterfen met een dergelyken breeden rand  
Linnéus! Syst. Nat. 762. 3 Roefel 1 deel  
plaat 3 figuur 5.

TAB XXXXIV




N. Meerburch fecit





TABXLV



11 Kuerbungh fuit

Plaat 45.

Dirce. Nijf-kapel, die de wukere hoekig  
heeft en bruin, de voorflen met een geelen  
bano, van onderene oet met zwart gegolfe.  
Houttuyn II Stuk H. 325. 117. deze kapel heeft  
reel overeenkomst met de Batel of het Esfe-  
quibfch Kapetelje of pagie, zo het dezelve  
niet is. by Houttuyn H. 301. 169. plaat 09. fig. 9.  
zie dezelve aan de boren en onderzijde liggende

TABXLV




11 Meerburg's fruit





TAB XLVI



Plaat 46.

Bixa. Karolijnfche Kapelletje dat de riken rondagtig en bruin. aan den grondsteen groen heeft; de agterften van anderen met een mek-  
vellen band. Dit Kapelletje heeft de sprieden haakig, als een half flag van Tug en Nagt-kapellen. *Flouituyt II Deel Pl. 377 (165.)* zie *Merian Suuraamfche jachtten plaat. 44.*

TAB XLVI



N. Meerburch fecit

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



LVII



N. Sherburne fecit

Plaat 47.

Phidiät. Oost-indisch Dik-kopje, dat de  
wieken rondagtig, glinsterend zwart met witte  
randen heeft, den bek en aars rood. Houltuyn  
ii Stuk H. 377. (164.) zie en drie zo aan de  
boven als onderzijde, liggende, vertoont.

TAB XLVII



N. Sherridge fecit







*N. Kierburg & fecit*

Plaat 40

AONI. Gewolke Chinese Paauw-oog.  
Vormig kapel, die de waken hoekig heeft en  
grauw, de voortlen geelachtig gewolkt; van 2  
boren met anderhalf oogjes geteekent.  
Houttuyn II. Pluk. H. 205. (91.)

XLVIII



*N. Meunier & fecit*





TAB XLIX



Plaat 49.

Quercus. Pagietje van de Eikenboomen,  
kapelletje dat de wicken eenigermate gestlaart  
en van boven blaauw heeft, van onderen afgeaast  
met een witte streep en twee oranjekeurige  
stippen bij den oors. zie er op de plaat twee  
eenigzins onderscheiden vliegende, en een op  
een blad zittende. Houttuyn II Stuk bladzide  
359 (120.) en P. Admiraal noemt ze de Zorgeboze.




N. Hurlburg fecit





TABL




N. Meunbush & Fecit

Plaat 50

Dejanira. Rofse of Bruine Argus een  
nimf-kapel, die de wieken getand en bruin heeft  
de borenften ieder met vijf oogjes van onderen  
veelagtig gewolkt met een witten band waar in  
op de voorften zeren en rode agterften vijf of  
zes oogjes staan Linnéus Syst. Nat. 774.  
zie bij Ploutbuis II Stuk. bl. 200. 291. 294.  
296—299 ondercheidene foorten van Argus



TABL



N. Meunier & Fecit





# TAB LI



*N. Neerburg & fecit*

Plaat 51.

*Caricae*. Oranje-kleurig (of geel) kappelche  
dat de wiken ongekarteld en oranje-kleurig heeft,  
met een oemeene witte plek in 't midden, den  
rand afgraauw gevoegd. *Floutuyn II. Huk II.*  
*372 (150.)* & *Merian Suin. nederl. plaat 40.*  
*figuur 1.* Dit kappelche ontvond zig op de  
*Papaja-boomen te Suriname.*

# TAB LI



N. Neerburg & fecit





TAB LII



Plaat 52.

*Annathæa*. Vrijf kapot, die de wuikom hie-  
lig heeft, van boven bruin met witte lippen,  
een roden of geelē band en een zwarte  
gegroefde streep. woont in de midien. zie  
Stukken II stuk 325. (110)

Deze kapot bhijnt een verscheidenheid te zijn  
van de *Annathæa*. zie de volgende plaat.

TAB LII



Nicolaus Herburger fecit







*N. Menziesii facit*

Plaat 53.

Amathau. Wimp-kapel, die de wicken hoekig heeft, van boven bruin, met witte strepen, een rooden band, en een zwarte gegolfde streep.

Kruttuyn H. 325 (110.) zie een ander soort van Amathau op de vorige plaat.

Deze kapel is van anderen vulgeel met een bruinen band, zie dezelfde op een blad zittende, en aan de bovenzijde vliegende verbeeld.

TAB LIII



*N. Meunier fecit*





TAB. LIV



N. Meenburch fecit

Plaat 54.

Tephüs. kapel, die de wiken ongeveer maaten ge-  
staart en van boren waart heeft, de wortlen met  
twee witte vlakken, de agtersten met een witte  
rood gerande plek. De wiken hebben boren  
dien witte stippen aan den rand, en de wortlen  
zyn, van onderen, rood geaderd. Floutlayn  
ii Stuk. Pl. 302. (170.) onder de ongeschikte kapel-  
len.

TAB. LIV



N. Meenburch fecit






TAB LV



Plaat 55.

Oenone. Blaauw-slakkige Chinese Kapel.  
Vierf-kapel, die de wicken gekarteld heeft de voor-  
sten witagtig gestrekt, (lêrer geel met breede donker  
bruine randen.) met twee kleine oogjes; de agter-  
sten met een hemel-blaauwe plek, met twee oogjes  
geteekend, dog sommige dezer kapellen hebben  
een oogje, men bekijkt deze tot de Chinese  
Paauzen. Houttuyn II stuk. Bladzij 205 (92.)

TAB LV



*N. Meerburg & fecit*













